

Comment utiliser PrWINLEVI® (crème de clascotérone)



Préparation

Lavez et séchez délicatement la surface de la peau à traiter.



Application

Appliquez une couche fine et uniforme de WINLEVI® sur la zone sujette à l'acné. La dose recommandée par application de WINLEVI® est de **1 gramme au maximum**.

N'appliquez pas le produit de façon localisée pour obtenir de meilleurs résultats et lavez-vous les mains après avoir appliqué WINLEVI®.



Fréquence

Appliquez la crème WINLEVI® une fois le matin et une fois le soir.

Veuillez consulter le feuillet destiné aux patients pour les renseignements complets sur la posologie et l'administration.



Voulez-vous une démonstration?
Scannez le code QR pour lancer la vidéo concernant le mode d'emploi.



Pour vérifier si vous utilisez la quantité appropriée de WINLEVI®, apportez votre tube de WINLEVI® entamé à vos rendez-vous de suivi.



Scannez le code QR ou visitez le site winlevi.ca pour en savoir davantage sur le traitement par WINLEVI®



Scannez le code QR ou visitez le site externe acneaction.ca pour de plus amples renseignements sur l'acné



Scannez le code QR ou visitez le site sunpharmabpp.ca pour accéder aux services de soutien à votre disposition

WINLEVI® est appliqué sur la peau (utilisation topique) pour traiter l'acné vulgaire chez les personnes de 12 ans et plus.

Winlevi®
crème de clascotérone 1% p/p


EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES DE WINLEVI®

- Irritation cutanée locale telle que démangeaisons, sensation de brûlure, rougeur, desquamation, sécheresse
- Changement de couleur des poils à l'endroit de l'application

Il ne s'agit pas de tous les effets secondaires possibles que vous pourriez présenter en prenant WINLEVI®. Si vous présentez des effets secondaires non mentionnés ici, parlez-en à votre professionnel(le) de la santé. Veuillez consulter le feuillet destiné aux patients pour de plus amples renseignements sur les effets secondaires, notamment sur les effets secondaires graves, et signalez à votre professionnel(le) de la santé tout symptôme inconfortable ou effet secondaire qui perturbe l'exécution de vos activités quotidiennes.

ENTREPOSAGE DE WINLEVI® ET MISE AU REBUT

- Conservez le produit à la température ambiante (20 °C à 25 °C).
- **Évitez** de le congeler.
- Jetez le produit 180 jours après la date de délivrance ou 6 mois après la première ouverture du tube, selon la première éventualité.



MISES EN GARDE À RETENIR PENDANT L'UTILISATION DE WINLEVI® :

- N'utilisez pas le produit à proximité des yeux, des lèvres, de la bouche ou du vagin, ni sur les zones présentant des coupures, des égratignures, des éruptions cutanées ou des coups de soleil.
 - Évitez également d'appliquer le produit sur les coins du nez et les muqueuses (membranes tapissant les parois de certains organes ou les cavités à l'intérieur du corps).
 - En cas de contact avec les muqueuses, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.
- Ne donnez pas WINLEVI® à d'autres personnes, même si elles présentent les mêmes symptômes que vous. Cela pourrait leur nuire.
- Évitez d'utiliser des produits pour la peau qui peuvent assécher ou irriter votre peau, tels que savons et nettoyants médicamenteux ou abrasifs, savons, nettoyants et cosmétiques qui ont des effets fortement desséchants sur la peau, produits qui contiennent de grandes quantités d'alcool, astringents (utilisés pour assécher ou resserrer les tissus cutanés), épices ou citron vert.
- Utilisez le produit exactement comme votre professionnel(le) de la santé vous l'a indiqué.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?



1 833 388-0532



Med.InfoCanada@sunpharma.com


Winlevi®
crème de clascotérone 1% p/p



© 2025 Sun Pharma, ou ses filiales et sociétés affiliées. Tous droits réservés.

WINLEVI est une marque déposée de Cassiopea, S.p.A., utilisée sous licence exclusive. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

PM-CA-WIN-0048F